Zibebe bleu

<u>luutuuluitiniluunntkutoidentiil</u>

Vass8R01s176-180



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1234

Priviliza adea

Zibèbe blen 8 R 1 s-176-180







dinitualiantianliantianl

Juntumlumbadantesharreshar

Année:

Année:

Année:

Stratson:

Pour.: 0,5

L-M-P-Dim.: 44

L-M-C

Viyosur: 3,5

POII: (rig) - 1/2 érig - couché

Année:

TG-G-M-P-Dim.: 21

Année:

TG-G

alantun lantan hartun lantun l

Journal mile all material materials

ANNEE 1988

NOM Zibebe bleu n EMPLACEMENT & R1 1 176 180

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 4	4	21.3	25,3	2								
3 &	1.	21.3	25.3	1	5	25.5	31.5	3.6	28.7	1.8	4.8	5.9.88
5	4		21.5	4								
-	1	Pourrit	ure : 0	5	Port :	drige'	Vig 31.5	ueur	:3,5 lo	+ 2		+ 3
			0				0					

ANNEE 1989 NOM Zibebe bleu EMPLACEMENT 8 R 1 176-180

mi

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	F1 début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
2 3	3 2 2	203 203 203	233 · 233 ·	0	2,0	48.5	22.5	24.5	31.7	7.8	14.8	4,9
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Couche Vigueur: 4,5												

dagtedanindastadaniad

1990 ANNEE NOM

Zibele bleu EMPLACEMENT & R1 1 176. 180

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité	
1 2 3 4 5	6 4 5 4 6 25	123 13 13 13 13	15,3. 15,3. 15,3.	454925	8	16.5	17,5°	18,5	23,7	30,7	7,8	No.3 90
Pourriture : 0 Mill.					. 0	Port :			Vigueur:			

N° d'ordre : Zibele blen Cl 8 R 1 s 176-180 (s 176) Désignation : Emplacement : (A) BOURGEONNEHUND Epanoui 1(32) - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux (9 - duveteux (89 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité Laincuse 279. Blanc 191 - fauve cu roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé on cuivre 197 - vert (98) (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT sta (egs - en gouttiers - autres. Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 arandenses (202) - duveteuses (203) - cotonneuses 204 - dans villosité pubescente 160 - sans villosité laineuse (200) Face supérieure : blanches 275 - fauves ou rousces 206 - carminées 207 à lastré carminé 203 - jaune 209 - (à plages bronsées ou cuivrées 21) entièrement bronzées ou cais. des 211 - vertes Ping autres 213. (Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 29me et de 15 Bème fouille détachées sera notée). (E) JEUNES FFUILLES DU BAS Face inferioure ervores : glabre 214 - séteum 717 - velouté 216 - aranéeux 217 duvereux 210 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 262 sons villosité laineuse (83) Limbe : globus 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (2) - estouneux 225 - sans vill@site pubescente 284 sans villosité la neuse A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté Face supérieura Blanc 226 · fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 e à plages bronzées ou cuivrées 231/ - entièrement bronzées ou culvrées 232 - verte 233. A péticle glabre 234 - séteux 265 velouté 236 - aranéeux 237

duvoteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 266 - sans

villosité laineuse

Totalement - sillor - partiellement.

Juntandagi adaming bastari

Calvo 87

M' d'ordre :

Juntanlandia

Zilièbe blen 8 R 1 s. 176-180 (s.176) Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côfelé. Glabre (242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente (289 - sans villosité laineuse (289). Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos colore 254 - à raies 255 - vert 256. Woeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 250 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

tres courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 y vert 265 ou

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Zilièbre blen 8 R 1s-176-180 (°176) N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

luutuuduutin

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne - grande 143 Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45) - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2 - sans villosité laineuse 2(73).

limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux (53) - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2 - sans villosité laineuse 275).

dentarianian kertaalaataal

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - toupmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée (62) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161 Jayous

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre (73) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré (77) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo87

Zilièle bleu 8 R 1 s - 176-180 (s.1) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne (9) - Petite 70 (dimensions 14x). Läche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3.) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6 A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (78) aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :20 x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 61 Très pruinée (2) pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régul lère - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 66 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. a section transversale : régulière (67) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 113. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 10 - moyen 20 - court 121. A pédicelle de couleur : verte (2) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129 A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 434. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pégins - apyrène.

Limitan haring

Calvo 87

Zibebe bleu 8 R 1 s 176. 180(s.1)

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Lundom bindi ad natradimi

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9). Surface

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

dantanlantarlariahatanlariah

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - \bar{a} raies (2) - \bar{a} bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efface (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo88

N° d'ordre : Désignation : Zibele bleu Emplacement: 8 R1 A 176 - 180 Angle des nervures Sexe L_1/L_2

Juntimburtia

: (7) - (8) - (9) L2/L L2/L : $10^{2} - 11^{2}$ Nombre de lobes : $12 - 13 - 14 - 15 - 16^{2}$ Prof. sinus latéral Sup. : $17 - 18 - 19 - 20^{2}$ Prof. sinus latéral Inf. : $21 - 22 - 23 - 24^{2}$ Forme sinus pétiolaire : $25 - 26 - 27 - 28 - 29^{2}$

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

: 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

dantaniantankentadantanl

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

: 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle)

Angle du lobe terminal : (45) - 46) - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

: 1 - 2 - 3

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reimes 90